

## ¿Tiene alguna pregunta?

Comuníquese con nuestra Línea de consejos de enfermería las 24 horas. Estamos aquí para ayudarlo.



**Inglés:**

**(888) 275-8750**

**Español:**

**(866) 648-3537**

**TTY/TDD:**

**711**

Distribuido por Molina Healthcare. Todo el material de este folleto es solo informativo. No reemplaza las recomendaciones de su proveedor.

Para obtener esta información en otros idiomas y formatos accesibles, llame al Departamento de Servicios para Miembros. Este número telefónico se encuentra al reverso de su tarjeta de identificación de miembro.

**MolinaHealthcare.com**



# Clamidia



**MolinaHealthcare.com**



24239BROMDCAES  
201207

## ¿Qué es la clamidia?

La clamidia es una infección de transmisión sexual (ITS) común. El origen de la clamidia es bacteriano. El contacto sexual propaga las ITS. La infección afecta a hombres y mujeres de todas las edades.

## ¿Cuáles son los síntomas de la clamidia?

- Dolor al orinar
- Dolor en la parte baja del estómago
- Secreción vaginal en las mujeres
- Secreción del pene en los hombres
- Dolor durante las relaciones sexuales en las mujeres
- Dolor testicular durante las relaciones sexuales en los hombres

Es posible que no tenga síntomas. Es posible que no sepa que tiene clamidia.

## ¿Quién debería realizarse la prueba de la clamidia?

- Si está embarazada o cree que podría estarlo
- Si tiene 25 años o menos y tiene actividad sexual
- Si tiene más de 25 años de edad y:
  - Tiene una pareja sexual nueva.
  - Tiene más de una pareja sexual.

- Tiene relaciones sexuales con alguien que tiene otras parejas sexuales.
- No usa un condón durante las relaciones sexuales y usted o su pareja tiene actividad sexual con otras personas.

## ¿Con qué frecuencia debe realizarse pruebas?

Debe realizarse una prueba de la clamidia una vez al año.

## ¿Se puede tratar la clamidia?

Sí. La clamidia se trata con antibióticos. Si no se trata, la clamidia puede generar problemas de salud graves.

## ¿Cómo puede prevenir la infección por clamidia?

- Absténgase de todo tipo de relaciones sexuales para evitar las ITS.
- Siempre use condones de látex de forma correcta durante las relaciones sexuales.
- Limite su número de parejas sexuales.

**Siga las instrucciones de su proveedor y tome todos sus medicamentos. Consulte a su proveedor si los síntomas no desaparecen. Hágase una nueva prueba de clamidia si cambia de pareja sexual.**